

Observations hivernales notables d'oiseaux en Tunisie

Marcello Grussu^a, Gianni Conca^b, Andrea Corso^c et Habib Dlensi^d

Notable winter records of birds in Tunisia. The most interesting records made during five winter visits to Tunisia in the period 1992–2005 are presented, augmented by unpublished observations from other observers. Records include those of accidental winter visitors such as European Nightjar *Caprimulgus europaeus* (second winter record), Common Swift *Apus apus* (second and third records), Northern Wheatear *Oenanthe o. seebohmii* (fourth record) and Western Bonelli's Warbler *Phylloscopus bonelli*. A few important concentrations are also mentioned.

Résumé. Les auteurs rapportent les observations les plus remarquables effectuées à l'occasion de cinq excursions hivernales en Tunisie sur la période 1992–2005, complétées par des données non publiées d'autres observateurs. Ces observations comprennent, entre autres, des espèces accidentelles en hiver tels que l'Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* (seconde donnée hivernale), le Martinet noir *Apus apus* (deuxième et troisième données), le Traquet motteux *Oenanthe o. seebohmii* (quatrième donnée) et le Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli*. D'importants rassemblements sont également signalés.

La publication récente d'une avifaune de Tunisie par Isenmann et al. (2005) permet enfin d'avoir une référence synthétique et complète de l'ornithologie pour ce pays. Ici nous rapportons des observations remarquables non incluses dans cet ouvrage, effectuées pendant cinq voyages ornithologiques: 20 février–1 mars 1992 (M. Grussu), 26 novembre–9 décembre 2002 (M. Grussu, R. Rossi et P. Ruzzante), 1–10 décembre 2003 (M. Grussu, H. Dlensi), 2–9 janvier 2004 (G. Conca et H. Dlensi) et 17–24 janvier 2005 (A. Corso, C. Cardelli, O. Janni et L. Maumary). Les principales zones visitées furent la région méridionale à la limite de l'Erg (Gafsa–Tozeur–Douz–Bir Soltane / Ksar Ghilane), la partie centrale du pays près de Kairouan et la côte du Golfe de Gabès. Nous mentionnons également des observations inédites et crédibles par d'autres ornithologues.

Les données sont présentées comme suit: localité, effectif (si non précisé: se réfère à un individu), âge et sexe si connus, date(s) d'observation, observateur(s) si autre(s) que les auteurs. Les noms de localités sont ceux utilisés sur la carte Michelin no. 956.

Résultats

Pélican blanc *Pelecanus onocrotalus*

Embouchure de l'Oued Akarit, Golfe de Gabès, subadulte, 8 janvier 2004; Ile Boussila, Kneiss,

subadulte (le même individu?), 20 février 2004. L'individu de l'Oued Akarit a aussi été observé le 9 janvier (Dlensi en Isenmann et al. 2005). Il existe une dizaine d'observations antérieures.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*

Environs de Metlaoui, subadulte en vol en direction des monts de Selja, 29 février 1992. L'espèce est devenue abondante dans les zones humides côtières et les lacs intérieurs, mais demeure rare dans la région des oasis sahariennes où il n'existe que trois autres données (Isenmann et al. 2005).

Crabier chevelu *Ardeola ralloides*

Environs de Kairouan, 1 mars 1992; barrage d'El Haouareb, Kairouan, deux individus, 7 décembre 2003. Peu de mentions hivernales, la plupart concernant des individus solitaires dans le nord du pays (Isenmann et al. 2005) et deux individus le 19 janvier 2003 (Azafzaf & Feltrup-Azafzaf 2003).

Cigogne blanche *Ciconia ciconia*

A l'est de Kairouan, 13 individus, 28 décembre 1990 (R. Mascara, E. Giudice); environs de Enfida, 31 octobre, 12 novembre (H. Azafzaf) et 28 novembre 2002; Parc national de Bou Hedma, sept, 8 décembre 2003; piste entre Bir Soltane et Béni Kheddache, 21 janvier 2005. L'espèce hiverne de façon occasionnelle en Tunisie (Isenmann et al. 2005).

Fuligule nyroca *Aythya nyroca*

Barrage d'El Haouareb, Kairouan, environ 400 individus, 7 décembre 2003. Des groupes hivernants aussi importants n'ont jamais été signalés auparavant; ces dernières années la population hivernante était de 30–70 individus, avec un maximum de 200 (Isenmann *et al.* 2005).

Erismature à tête blanche *Oxyura leucocephala*

Barrage d'El Haouareb, Kairouan, environ 260 individus, 7 décembre 2003. L'espèce est sédentaire en Tunisie, mais des groupes d'une telle importance ont rarement été notés ces dernières années, le plus grand comptant 352 individus (Isenmann *et al.* 2005).

Milan noir *Milvus migrans*

Barrage d'El Haouareb, Kairouan, 7 décembre 2003 et 3 janvier 2004; route P1 quelques kilomètres au nord de Gabès, trois individus, 7 janvier 2004. Isenmann *et al.* (2005) cite neuf contacts concernant 1–2 individus entre octobre et janvier, dont seuls quatre en décembre-janvier.

Busard cendré *Circus pygargus*

Pont d'El Kantara/Ile de Jerba, individu mélanique, 5 décembre 2002. Une des quatre observations hivernales mentionnées par Isenmann *et al.* (2005), qui omettent de signaler qu'il s'agissait probablement de la première mention d'un individu au plumage mélanique.

Aigle botté *Hieraetus pennatus*

Barrage d'El Haouareb, Kairouan, individu de forme sombre, 7 décembre 2003; salines de Thyna/Sfax, individu immature de forme claire, 22 janvier 2005. Il s'agit des seules données récentes d'oiseaux hivernant en Tunisie. Isenmann *et al.* (2005) n'indiquent que cinq observations hivernales, la plus récente datant de 1978. Nos observations sont probablement à relier à l'influx sans précédent d'Aigle botté dans l'ouest de la Méditerranée d'octobre 2004 à mars 2005 (Baghino & Premuda 2005, Guillosso *et al.* sous presse).

Grue cendrée *Grus grus*

Route P16 au sud de Chebika, 50 individus volant en direction du Chott El Gharsa, 4 janvier 2004. Plusieurs milliers d'individus hivernent régulièrement dans les plaines du nord et du centre (Isenmann *et al.* 2005, H. Azafzaf com. pers.). Notre observation est probablement la

première en bordure du Sahara tunisien, dans une région aussi méridionale du pays.

Pluvier guignard *Charadrius morinellus*

Environs de la route P3 à 28 km au nord de Tozeur, environ 300 individus, 3 janvier 2004. L'espèce hiverne régulièrement en Tunisie, mais rarement en groupes d'une telle taille. Isenmann *et al.* (2005) mentionnent seulement deux observations de groupes plus importants.

Sterne voyageuse *Sterna bengalensis*

Mahdia, un individu, 5 janvier 2005 (V. Cavaliere). Cinquième observation hivernale en Tunisie. Les quatre précédentes ont toutes été effectuées beaucoup plus au sud, dans le secteur du Golfe de Gabès et autour de l'île de Jerba (Isenmann *et al.* 2005).

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

Barrage de l'Oued Rmal, Zaghouan, 27 novembre 2002; salines de Thyna/Sfax, 1–2 individus, 8 décembre 2002. Isenmann *et al.* (2005) donnent sept mentions hivernales (novembre–février) et considèrent la présence de l'espèce comme occasionnelle à cette époque de l'année.

Sterne naine *Sterna albifrons*

Salines de Thyna/Sfax, deux individus, 30 décembre 1991; quelques individus, 30 décembre 1993 (M. Bailo/Ornitours). Il y a moins de dix observations précédentes (Isenmann *et al.* 2005).

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*

Parc national de Bou-Hedma, un individu dans un petit bois d'*Eucalyptus* sp., 8 décembre 2003. Deuxième mention hivernale en Tunisie (Isenmann *et al.* 2005).

Martinet noir *Apus apus*

Sfax, un individu, 6 décembre 2003; Sousse, probablement trois individus, 9 décembre 2003; Sfax, 5–10 individus, 23 janvier 2005. Nous avons été particulièrement attentif à ne pas confondre ces oiseaux avec le Martinet pâle *A. pallidus*, présent de façon (quasi) régulière dans le Golfe de Gabès en hiver. La seule autre mention est celle de deux individus dans le Sebkhia El Menzel, 20–21 février 1986 (Isenmann *et al.* 2005).

Martinet des maisons *Apus affinis*

Gorges de Selja, Metlaoui, sept individus, 23 février 1990 (M. Bailo/Ornitours); 4–5 individus, 28 février 1992; 4–5 individus, 1 décembre 2002.

Le statut hivernal en Tunisie n'est pas encore défini de façon claire: l'espèce est donnée comme 'largement sédentaire', mais ceci est soutenu par seulement cinq données hivernales sur la période 1948–95 (Isenmann *et al.* 2005). L'aire d'hivernage en Tunisie indiquée par Snow & Perrins (1998) est trop étendue, étant donné l'absence d'autres mentions récentes. Nos observations dans les gorges de Selja semblent indiquer que l'espèce hiverne régulièrement sur ce site.

Martinet à ventre blanc *Tachymarptis melba*

Un peu au sud de Metlaoui, un individu, 28 février 1992. Donné comme présent de la fin mars (donnée la plus précoce: 11 mars) jusqu'en septembre–octobre, avec une observation le 13 décembre 1943 à Hammam Lif (Isenmann *et al.* 2005). Notre observation pourrait concerner soit un hivernant, soit un migrateur précoce.

Alouette bilophe *Eremophila bilopha*

Piste entre C105 et Bir Soltane, environ 1.000 individus, 21 janvier 2005. Dans le Maghreb, les seules données de regroupement de l'espèce viennent du Maroc, où Thévenot *et al.* (2003) cite la présence régulière de groupes de 5–40 individus en dehors de la période de reproduction et l'observation de deux groupes de 100+ individus.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*

Chott El Jerid, mâle de la sous-espèce *O. o. seebohmi*, 3 décembre 2003. Cette sous-espèce, qui niche à haute altitude au Maroc et en Algérie, est très rare en Tunisie (seulement huit observations, dont trois en hiver: Isenmann *et al.* 2005).

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli*

Zone inondée près de Kriz, Chott El Jerid, 6–7 individus, 29 février 1992. L'espèce est accidentelle en hiver en Tunisie (Isenmann *et al.* 2005).

Remerciements

Nous sommes fort redevables aux personnes suivantes: Rossanna Rossi et Paolo Ruzzante (Groupe Ornithologique Sardo/Sardinia), Carmela Cardelli, Ottavio Janni et Lionel Maumary qui ont participé à nos expéditions en Tunisie; Mauro Bailo (Ornitours) et Vincenzo Cavaliere pour leurs observations

inédites; Hichem Azafzaf pour son aide pendant les expéditions de 2002–03, ses données inédites, les renseignements concernant l'avifaune en Tunisie et la révision de cet article. Merci également à Gilles Faggio et à Jean-Yves et Tristan Guillosos pour la traduction des textes français et anglais et la relecture, et à Paul Isenmann pour ses remarques critiques.

Bibliographie

- Azafzaf, H. & Feltrup-Azafzaf, C. 2003. *Slender-billed Curlew Survey. Training and Awareness Raising in Tunisia. January 2003*. Preliminary Report. Tunis: UNEP/AEWA, AAO/GTO & BirdLife International.
- Baghino, L. & Premuda, G. 2005. Autunno 2004: eccezionale invasione di Aquile minori. *Quaderni di birdwatching* 13. www.ebnitalia.it/QB/QB013/index.htm
- Guillosos, T., Garcia, F. & Jardin, M. sous presse. Afflux remarquable d'Aigles bottés *Hieraaetus pennatus* sur la façade méditerranéenne française au cours de l'automne 2004. *Ornithos*.
- Isenmann, P., Gaultier, T., El Hili, A., Azafzaf, H., Dleni, H. & Smart, M. 2005. *Oiseaux de Tunisie / Birds of Tunisia*. Paris: Société d'Études Ornithologiques de France.
- Isenmann, P. & Moali, A. 2000. *Oiseaux d'Algérie / Birds of Algeria*. Paris: Société d'Études Ornithologiques de France.
- Snow, D. W. & Perrins, C. M. (eds.) 1998. *The Birds the Western Palearctic. Concise Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Thévenot, M., Vernon, R. & Bergier, P. 2003. *The Birds of Morocco: An Annotated Checklist*. BOU Checklist No. 20. Tring: British Ornithologists' Union & British Ornithologists' Club.
- ^aGruppo Ornitologico Sardo, Via De Candia, 47, 09045 Quartu Sant'Elena, Cagliari, Italy. E-mail: porphyrio@tiscali.it
- ^bVia S. Allende, 3, 27100 Pavia, Italy. E-mail: sula@libero.it
- ^cVia Camastra, 10, 96100 Siracusa, Italy. E-mail: volorante@yahoo.it
- ^dclo Association 'Les Amis des Oiseaux', B.P.: 86, 3018 Sfax, Tunisie

Reçu le 25 janvier 2005; révision acceptée le 25 avril 2006